

بررسی ابعاد ادراک از خداوند در بیماران همودیالیزی شهر قزوین در سال ۱۳۹۵

سیده زهرا حسینی گل افشانی^{۱*}، سونیا اویسی^۲، فرنوش رشوند^۳، فاطمه گودرزی^۴، محمد حسین مافی^۵

^۱ استادیار، گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
^۲ دانشیار، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
^۳ استادیار، گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
^۴ استادیار، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
^۵ دانشجوی کارشناسی پرستاری، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران
 * نویسنده مسئول: سیده زهرا حسینی گل افشانی، استادیار، گروه پرستاری مراقبت ویژه، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوین، ایران. ایمیل: z.hoseinigolafshani@qums.ac.ir

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۶/۰۴/۳۰

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۶/۰۴/۱۷

چکیده

مقدمه: ادراک فرد از خداوند شرط اساسی و پایه شکل گیری روابط انسان با محیط اجتماعی اوست. در واقع شناخت آگاهانه و درک عمیقتر افراد از خداوند در رفتار و کیفیت تعاملات روزانه آنها تأثیری بس شگرف خواهد داشت. مطالعه حاضر با هدف تعیین ابعاد ادراک از خداوند در بیماران همودیالیزی شهر قزوین انجام شده است.

روش کار: مطالعه حاضر به شیوه مقطعی بر روی ۱۰۰ نفر از بیماران همودیالیزی مراجعه کننده به مرکز آموزشی و درمانی بوعلی سینا شهر قزوین انجام شد. نمونه‌ها به شیوه تصادفی طبقه‌ای وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ادراک از خداوند لارونس (۲۰۰۷) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۲ و آمار توصیفی و استنباطی (همبستگی پیرسون، من ویتنی و T مستقل، کروسکال والیس، ANOVA) انجام گرفت.

یافته‌ها: یافته‌های مطالعه نشان داد بین زیر مقیاس‌های ادراک از خداوند "درک از مشیت الهی" با میانگین و انحراف معیار $3/2 \pm$ $33/6$ در سطح بالاتر و "درک از تأثیرپذیری خداوند" با میانگین و انحراف معیار $34 \pm 31/2$ در سطح پایین‌تر قرار دارند. همچنین میزان ادراک از خداوند در افراد مؤنث با میانگین و انحراف معیار $10/3 \pm 195/6$ بالاتر از افراد مذکر می‌باشد.

نتیجه گیری: بر اساس نتایج مطالعه با توجه به تفاوت جنسیتی مطرح شده می‌توان با برگزاری دوره‌های آموزشی آشنایی با مفهوم ادراک از خداوند و تأثیر ناخودآگاه آن بر کیفیت تعاملات روزانه، سبب افزایش توان خود مراقبتی و کیفیت زندگی بیماران دیالیزی شد.

واژگان کلیدی: همودیالیز، ادراک از خداوند، بیماران

تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه

بیماران کلیوی ایران آمار بیماران دیالیزی استان قزوین ۴۴۹ نفر می باشد که از این میزان ۳۲۸ نفر در شهرستان قزوین به مرکز دیالیز مراجعه می‌نمایند. علی رغم اینکه در حال حاضر همودیالیز، روش اصلی جایگزین کلیه می‌باشد، اما این شیوه زندگی همواره با استرس‌های فراوانی همراه بوده که پیامد آن قطعاً سلامت روانی و اجتماعی بیماران را تحت تأثیر قرار خواهد داد (۵). در همین راستا نتایج برخی مطالعات اختلالاتی را در سبک زندگی این بیماران به دلایلی نظیر مشکلات جسمی، بستری شدنهای مکرر، بیکاری، مشکلات مالی، محدودیت در رژیم غذایی، کاهش توانایی در اداره امور زندگی و مشکلات جنسی و

سالانه بیش از ۶۰ هزار نفر در سراسر جهان به علت ابتلا به بیماری‌های کلیه جان خود را از دست می‌دهند (۱). رشد سالانه این بیماری در ایران طبق آمار مرکز مدیریت پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت حدود ۱۱٪ می‌باشد (۲). علاوه بر آن آمار بیماران تحت همودیالیز ایران سالانه حدود ۱۵ درصد افزایش می‌یابد (۳). بر اساس آخرین آمار ارائه شده توسط مرکز مدیریت پیوند و بیماریهای خاص ایران، تعداد بیمارانی که در کشور ما دچار نارسایی پیشرفته کلیوی هستند حدود ۲۵ هزار نفر می‌باشد که تقریباً ۵۰ درصد این بیماران تحت درمان با همودیالیز می‌باشند (۴). به گزارش انجمن خیریه حمایت از